

# Pas 1

Observarea semnelor și simptomelor respiratorii, de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, febră, frison, dureri de cap, tulburări digestive, stare generală modificată.

# Pas 2


În cazul în care temperatura înregistrată depășește  $37.3^{\circ}\text{C}$ , se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.

# Pas 3

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste  $37.3^{\circ}\text{C}$  sau/și prezența altor semne, din cele enumerate, ne adresăm telefonic pentru consult la medicul de familie.

## Medic de familie

Dacă se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va recomanda testarea.



Dacă nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecțiune și dacă e cazul, va elibera concediu medical.



# Testarea

**Test antigenic rapid efectuat la o unitate sanitară sau la un laborator** (nu autotestarea la domiciliu, întrucât nu are validitate oficială pentru recunoașterea îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 și acordarea de concediu medical).

## Rezultat pozitiv la test rapid antigenic

Persoana se autoizolează la domiciliu, anunță medicul de familie și așteaptă să fie sunat de un reprezentant al DSP pentru efectuarea anchetei epidemiologice care va stabili contactii. Atât persoana bolnavă cât și contactii declarați în cadrul anchetei, vor primi concediu de boală de la medicul de familie, pe toată perioada izolării de 14 zile.



## Rezultat negativ la test rapid antigenic

Comunică rezultatul medicului de familie, care stabilește conduita ulterioară pentru pacient.



# Testarea

**Test antigenic rapid efectuat la o unitate sanitară sau la un laborator** (nu autotestarea la domiciliu, întrucât nu are validitate oficială pentru recunoașterea îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 și acordarea de concediu medical).

## Rezultat pozitiv la test rapid antigenic

Persoana se autoizolează la domiciliu, anunță medicul de familie și așteaptă să fie sunat de un reprezentant al DSP pentru efectuarea anchetei epidemiologice care va stabili contactii. Atât persoana bolnavă cât și contactii declarați în cadrul anchetei, vor primi concediu de boală de la medicul de familie, pe toată perioada izolării de 14 zile.



## Rezultat negativ la test rapid antigenic

Comunică rezultatul medicului de familie, care stabilește conduita ulterioară pentru pacient.



# Testarea

## Test RT-PCR prin apelare la 112.

Se respectă izolarea la domiciliu până la sosirea ambulanței și se anunță obligatoriu medicul de familie pentru a fi monitorizat. Dacă ambulanța nu poate veni în aceeași zi, medicul de familie va elibera concediu medical de la momentul începerii monitorizării până la momentul sosirii rezultatului la testare.

**Dacă rezultatul este pozitiv**, medicul de familie va monitoriza în continuare, zilnic, persoana bolnavă și contactii și va elibera concediu medical de 14 zile, la sfârșitul perioadei de izolare a persoanei bolnave (pe baza raportului medical) sau de carantinare pentru contacti (pe baza deciziei de carantină). Raportul medical și decizia de carantină sunt transmise de DSP prin email medicilor de familie.

---

**Statutul de carantinat** se stabilește de către un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică în cadrul anchetei epidemiologice (întocmirea listei de contacti pentru cazul confirmat).

